

BRIGADA DE EMERGENCIA FIM

Decano FIM - Orlando Aguilar

Coordinadora General | Ariadna Quintero

LOGÍSTICA Y COMUNICACIÓN

Iván Medina

Ariadna Arguelles

Tania Díaz

Eladio Ávila

EVACUACIÓN

Juan Blandón

Katherine Chung

Aydenira Guzmán

Adrián Steele

Alexandra Núñez

Orlando Aguilar

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

Eduardo Stanziola

Caroline Reyna

Nacor Martínez

Jimmy Chang

PRIMEROS AUXILIOS

Diana Berrocal

Nataly Vásquez

Ámbar Velarde

Gabriela Carvajal



Escanee el código QR para acceder a la información de la Brigada FIM

NÚMEROS DE SEGURIDAD

INTERNOS

Seguridad UTP

560-3458

Edificio VIDE

560-3585

Garita Vehicular

560-3362

Edificio Administrativo

560-8206

Edificio #1

560-3471

Edificio #3

560-3459

Edificio #4 (Aulas)

560-3581

Edif. de Investigación

560-3582

Edif. de Rectoría

560-3027

Brigada FIM

560-3000, ext. 3906

Decanato

560-3083 / 3084

Clínica Universitaria

560-3205 / 3169

Bienestar Estudiantil

6833-5851

SEMM (ambulancia)

366-0122 / 6618-4122

JPR (ambulancia)

800-7872 / 6328-7872

EXTERNOS

Ambulancia SUME

911

Ambulancia CSS

107

Ambulancia Cruz Roja

*455

Bomberos

512-6166 / 103

Policlínica de Betania

503-1254

Whatsapp - 6943-7606

Sinaproc

*335

Policía Nacional

230-2324 / 104

Whatsapp -6943-7606

Hosp. San Mig. Arc.

523-6906

CSS Dr. Arnulfo Arias

503-6032

Hosp. Santo Tomás

507-5600

Hosp. Irma L. Tzanet.

503-8700

Hospital Santa Fe

360-7400

Hospital Minimed

263-6464


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA (FIM)

Instructivos de Actuación en
Caso de Emergencia

IACE FIM-01

Ataques de Abejas



Fuente: Plan Institucional de Emergencias y
Evacuación en Caso de Desastres de la
Facultad de Ingeniería Mecánica (PIEECD-FIM)

PROCEDIMIENTO DE USO

Este instructivo se utilizará en caso de ocurrir una emergencia por exposición a picaduras de abejas, que pueden ocasionar reacciones como anafilaxis, además de otros daños en las personas.

Acciones iniciales

- Cualquier colaborador y estudiante vinculado con la FIM que sea alérgico a picaduras de abejas deberá portar consigo su medicamento para ser administrado inmediatamente ante una emergencia con abejas
- En caso de encontrar un panal de abejas, en un radio menor a 150 pies. No espante, golpee, aplaste o mate una abeja que se le aproxime. Al ser aplastadas, ellas segregan una sustancia que atrae a las que se encuentren cerca y las pone muy agresivas.
- Si se le acercan abejas, aléjese del área y comuníquese con el departamento de mantenimiento de la UTP para que se comuniquen con los bomberos para encontrar y destruir el panal.



Incidentes con Abejas Africanizadas

Los síntomas de una reacción normal a una o varias picadas de abejas son hinchazón, dolor y enrojecimiento del área de la picada.

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA:

Aléjese lo más posible de las abejas y busque refugio dentro de un lugar cerrado u oficina, preferiblemente si tiene aire acondicionado. No se tire dentro de un cuerpo de agua; ya que las abejas africanizadas le esperarán para atacarle cuando salga a tomar aire. Las abejas africanizadas le perseguirán al menos por 150 pies con el fin de proteger su panal. Las abejas vuelan entre 12-15 mi./hr. En caso de que algún personal sea picado por abejas africanizadas se deben seguir los siguientes pasos:

- Busque atención médica rápidamente.
- No trate de extraer los aguijones con pinzas o con los dedos; ya que el hacerlo causará que más veneno entre al cuerpo.
- Remueva los aguijones de la piel o el cuero cabelludo lo más rápidamente posible haciendo un movimiento de barrido con las uñas, o con un carné de identificación, o con la hoja de una navaja.
- No deje los aguijones en la piel; ya que éstos pueden seguir inyectando veneno en el cuerpo por hasta 10 minutos después de las picadas.
- Si no presenta síntomas de anafilaxis ponga hielo sobre las picadas para reducir la hinchazón

Nota

Menos de 1 en 100 personas reaccionará con anafilaxis a una o más picadas de abejas africanizadas. Para que una persona normal y sana reciba una dosis mortal necesitaría alrededor de 10 picadas por libra de peso. (ej.: 1500 picadas para una persona de 150 lbs.)

Los síntomas de anafilaxis, ya que pueden manifestarse inmediatamente o pueden demorar hasta 20 minutos para manifestarse son:

- Urticaria y picazón por gran parte del cuerpo.
- Hinchazón de la garganta, labios, lengua o alrededor de los ojos.
- Dificultad para respirar y tragar.
- Mareos, dolor de cabeza severo, calambres estomacales, náusea o diarrea,
- Incremento en la frecuencia cardíaca (pulso acelerado), caída de la presión arterial.
- Debilitamiento súbito, shock y pérdida del conocimiento.
- Algunos pacientes que experimentan anafilaxis severa pueden necesitar atención respiratoria y/o cardíaca y hasta resucitación, si dejan de respirar.
- Reacciones tardías/secundarias pueden ocurrir; los pacientes deberán permanecer bajo supervisión médica por al menos 4 horas después de un episodio de anafilaxis.

En caso de presentarse uno de estos síntomas contactar a los sistemas de emergencia externos para la atención del caso

